

Beste ouder,

Vaccinaties beschermen niet alleen je kind tegen ernstige infecties, maar ook jouw gezin en de omgeving. Naast het klassieke vaccinatieschema van de Vlaamse Gemeenschap dat beschikbaar is bij Kind en Gezin en uw kinderarts, worden er nog een aantal vaccinaties aanbevolen. Aan de hand van deze brochure willen we je hierover informeren.


Heb je na het lezen van deze folder nog specifieke vragen, stel ze dan gerust aan je kinderarts.

Maak een afspraak via UZA@home of mijnzas.be



Klinische studies voor nieuwe en verbeterde vaccins

Klinische studies helpen vragen over nieuwe vaccins, therapieën of geneesmiddelen op te helderen. Vaccins ontwikkelen tegen onbekende ziekteverwekkers alsook hun werkzaamheid en veiligheid onderzoeken is één van de belangrijkste wereldwijde uitdagingen vandaag.



Zonder vrijwilligers geen nieuwe vaccins

Meld je aan voor het vrijwilligersregister of schrijf je in voor een studie

Door deel te nemen aan een klinische studie, kan je een belangrijke bijdrage leveren aan de wetenschappelijke vooruitgang. Bovendien kan jouw kind dan ook reeds beschermd worden met nieuwere (en mogelijks betere) vaccinaties. Het Antwerp Pediatric Clinical Trial Network voert deze studies uit bij kinderen en werkt nauw samen met het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties voor studies bij volwassenen.

Het maakt overigens deel uit van de Antwerp Pediatric Health Harbour. Dit is een initiatief binnen de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen in samenwerking met het Helix en ZAS netwerk om de zorg voor het Antwerpse kind te promoten.

Meer info vind je op uantwerpen.be/apctn



Wat kan je doen?

Je kan jezelf of je minderjarig kind inschrijven in het vrijwilligersregister. Bij toekomstige klinische studies zullen wij je dan via e-mail contacteren. Door je in te schrijven in het vrijwilligersregister verbind je je tot niets. Je kan je inschrijving op elk moment intrekken en je gegevens zullen worden verwijderd. En het allerbelangrijkste: gegevens blijven geheim en worden voor geen enkel ander doeleinde gebruikt. Meer info vind je op uantwerpen.be/apctn-vrijwilligersregister

Waar vind je ons?

I Vaccinopolis - Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties

Universiteit Antwerpen - Campus Drie Eiken, Drie Eikenstraat 663, 2650 Edegem
uantwerpen.be/vaccinstudies

Waar vind je nog meer info?

De Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde heeft nog een meer uitgebreide folder over aanvullende vaccinaties. Deze vind je op de website van de VVK vkindergeneeskunde.be


Heb je nog specifieke vragen over vaccinatie (studies) voor je kind?

Mail het Antwerp Pediatric Clinical Trial Network via apctn@uantwerpen.be

Daarnaast kan u de verantwoordelijke voor pediatrische vaccinatie(studies) in het centrum in je buurt contacteren of een afspraak maken:

- **UZA:** Prof. Dr. Stijn Verhulst en Dr. Tine Boiy
- **Universiteit Antwerpen:** Prof. Dr. Ilse De Coster, Prof. Dr. Paolo Palma en Dr. Toon Janssen
- **ZAS Campus Cadix:** Dr. Yentl Driesen
- **ZAS Campus Koningin Paola:** Prof. Dr. Ine Decuyper en Dr. Greta Stevens
- **ZAS Campus Jan Palfijn:** Dr. Eva ter Haar
- **ZAS Campus Sint-Vincentius:** Prof. Dr. Daan Van Brusselen
- **ZAS Campus Sint-Augustinus:** Dr. Florence Slap en Prof. Dr. Athina Van Gasse

Aanvullende vaccinaties en vaccinatiestudies



I Meningokokken type B

Meningokokken kunnen een ernstige vorm van hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging veroorzaken. Een meningokokkeninfectie kan in de loop van enkel uren levensbedreigend zijn. Voornamelijk jonge kinderen (0 tot 5 jaar) en jongvolwassenen (15 tot 19 jaar) worden erdoor getroffen. Ter aanvulling van het gecombineerd vaccin tegen meningokokken types A, C, W en Y bestaat er nu ook het vaccin tegen meningokokken type B. Dat zit nog niet in het standaard vaccinatieschema van de Vlaamse gemeenschap.

Het vaccin tegen meningokokken B kan worden gegeven vanaf de leeftijd van 2 maanden. De prijs per dosis bedraagt 86 euro. Deze vaccinatie wordt op dit moment nog niet terugbetaald. Informeer bij je mutualiteit naar eventuele deelname in de kostprijs. Bij opstart op de leeftijd van 2 maanden zijn er 3 dosissen nodig (2 injecties met 2 maanden interval en een booster na +/- 1 jaar). Bij opstart na de leeftijd van 2 jaar zijn er 2 dosissen nodig (2 injecties met 1 maand interval zonder booster).

Reacties op dit vaccin (koorts en lokale roodheid) kunnen wat heviger zijn, zeker wanneer het samen met andere vaccins wordt toegediend. De bijwerkingen zijn minder hevig indien je net voor de vaccinatie paracetamol toedient. Dien na de vaccinatie nog 2 dosissen paracetamol toe met een tussentijd van 4 tot 6 uur.

I Pneumokokken

De Hoge Gezondheidsraad beveelt sinds april 2025 de PCV20-vaccinatie aan voor alle baby's. Dit vaccin beschermt tegen twintig verschillende types **pneumokokken**. Dat zijn er 7 meer dan het terugbetaalde PCV13-vaccin in het standaard vaccinatieschema. Deze bacteriën kunnen ernstige infecties veroorzaken, waaronder longontsteking, hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. Omdat pneumokokken veel voorkomen bij jonge kinderen, helpt vaccinatie niet alleen uw eigen baby te beschermen, maar draagt ze ook bij aan een betere bescherming van de hele gemeenschap.

Het PCV20-vaccin biedt een ruimere bescherming dan het terugbetaalde PCV13-vaccin, omdat het extra bacterietypes omvat die de laatste jaren vaker circuleren in België. Baby's krijgen het PCV20-vaccin in vier doses: op de leeftijd van 8, 16 en 24 weken en een herhalingsdosis op de leeftijd van twaalf maanden. Indien je kind tussen 1 en 5 jaar oud is of een verhoogd risico heeft, en enkel PCV13 kreeg, kan je een extra, éénmalige vaccinatie met PCV20 bespreken met je kinderarts. Het PCV20-vaccin wordt op dit moment nog niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt ongeveer 67 euro per dosis.



I Respiratoir Synctieel Virus (RSV)


RSV is een veelvoorkomend seizoensvirus (september–maart) en de belangrijkste oorzaak van ernstige luchtweginfecties bij baby's in hun eerste levensjaar. Meestal veroorzaakt RSV milde verkoudheidsklachten, maar bij jonge baby's, vooral jonger dan 12 maanden, kan het snel evolueren tot een ernstige longontsteking. Recent kwamen nieuwe preventieve middelen op de markt om baby's en jonge kinderen te beschermen tegen RSV. Monoklonale antilichamen (nirsevimab, Beyfortus®) worden tijdens het RSV-seizoen direct na de geboorte, of (wanneer je kindje buiten het seizoen werd geboren) bij de start van het RSV-seizoen als inhaalprik aangeraden. Je kind is onmiddellijk beschermd tegen RSV gedurende minstens 6 maanden. Je kan ook kiezen voor een vaccinatie tijdens de zwangerschap (RSVpreF vaccin, Abrysvo®). De monoklonale antilichamen worden terugbetaald als de moeder tijdens de zwangerschap het maternale RSV-vaccin niet kreeg.

I Varicella (windpokken)

Bijna iedereen krijgt als kind **windpokken**; het is een typische kinderziekte. Kinderen genezen meestal na enkele dagen. Na genezing ben je levenslang tegen windpokken beschermd. Het virus blijft echter wel sluimerend aanwezig in het lichaam. Wordt het virus toch terug actief, dan kan dit zona (gordelroos) veroorzaken.

Meestal verlopen windpokken zonder complicaties. Soms doen er zich echter complicaties voor, zoals longontsteking, bacteriële bijbesmetting of ontsteking van het hersenweefsel (encefalitis). Zeer zelden zien we dat een kind overlijdt als gevolg van windpokken (in België ongeveer 1 kind per jaar).

Vaccinatie tegen Varicella beschermt (voor 70 à 100 %) tegen het krijgen van windpokken. Het vaccin kan worden toegediend vanaf de leeftijd van 12 maanden. Vraag aan je kinderarts of dit voor je kind nodig/zinvol kan zijn. De prijs per dosis bedraagt ongeveer 50 euro. Dit vaccin wordt niet terugbetaald. Informeer bij je mutualiteit naar eventuele deelname in de kostprijs. Er zijn 2 dosissen nodig, met minstens 4 à 6 weken tussen.



I Influenza (griep)

Het **griepvaccin** wordt aangeraden voor kwetsbare groepen zoals oudere mensen en zwangere vrouwen, maar zeker ook voor kinderen ouder dan 6 maanden met chronische problemen zoals longproblemen, hartafwijkingen, nierziekten, afweerstoornissen,...

Aan gezonde personen die onder hetzelfde dak wonen als baby's jonger dan 6 maanden, of de hierboven beschreven kwetsbare personen, wordt ook aangeraden zich te laten vaccineren. Omdat het griepvirus ieder jaar verandert, moet het vaccin jaarlijks worden toegediend, in de maanden oktober tot december. De prijs van het vaccin is ongeveer 15 euro. Voor chronische zieken is er een terugbetaling.

Kinderen kunnen gevaccineerd worden vanaf de leeftijd van 6 maanden. Indien je kind jonger dan 9 jaar is en vroeger nog niet tegen griep gevaccineerd werd, krijgt het de eerste keer 2 dosissen met een tussentijd van minstens 4 weken. Nadien is 1 dosis per jaar nodig.

I Reisvaccinatie

Wanneer je op reis gaat, kunnen een aantal **extra vaccins** nodig zijn. Het kan gaan om vaccinatie tegen tekenencefalitis (bij reizen naar Scandinavië, Oostenrijk, sommige streken in Duitsland en Oost-Europa) en hepatitis A, hondsdoelheid of Japanse encefalitis (bij meer tropische reizen) of een vervroegde toediening van het meningokokken ACWY vaccin (bij reizen naar Sub-Sahara-Afrika of risicogebieden). Bijna al deze vaccinaties zijn reeds mogelijk op kinderleeftijd en kunnen toegediend worden door een (kinder)arts met ervaring in reisziekten.

Voor specifieke vragen over reizen met kinderen – alsook malariaprofylaxe – kan je terecht bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG – wanda.be) of bij je kinderarts in UZA of ZAS. Je kinderarts kan je zo nodig gericht doorverwijzen naar een kinderinfectioloog of kinderarts gespecialiseerd in reisziekten. Enkel de gelekoorts vaccinatie moet steeds in het Instituut voor Tropische Geneeskunde gebeuren.