

Vragen over Pneumokokken?

Het expertenpanel antwoordt

Prof. dr. Heidi Theeten (UAntwerpen)





Pneumokokken

Sommige pneumokokken vaccinatie schema's zijn door gewijzigde teststrategie in de loop der tijd of onzorgvuldigheid uitgelopen zodat er veel tijd is tussen twee vaccins.

Mogen we het als oke beschouwen als je een volwassene pneumo 23 gaf en 7 jaar later prevenar?

Prof. dr. Heidi Theeten (UAntwerpen)

Poll vraag: Mogen we het als oke beschouwen als je een gezonde 65 plusser pneumo 23 gaf en 7 jaar later prevenar?

- A. Ja
- B. Neen, er is een 2de dosis pneumo 23 nodig
- C. Neen, er is een 2de dosis prevenar nodig

Poll vraag: Mogen we het als oke beschouwen als je een gezonde 65 plusser pneumo 23 gaf en 7 jaar later prevenar?

- A. Ja
- B. Neen, er is een 2de dosis pneumo 23 nodig
- C. Neen, er is een 2de dosis prevenar nodig

SAMENVATTING VAN VERANDERINGEN T.O.V VORIGE AANBEVELING

- Deze aanbeveling werd afgestemd op de aanbevelingen van HGR 9158: "Vaccinatie van immuungecompromitteerde en chronische zieke kinderen en/of volwassenen".
- Diabetes en neurologische of neuromusculaire aandoeningen met aspiratierisico worden opgenomen in de lijst met chronische aandoeningen die een indicatie vormen voor pneumokokkenvaccinatie (HGR 9158).
- Voor volwassenen tussen 50 en 85 met comorbiditeit wordt er na primo-vaccinatie met PCV13 gevolgd na minstens 8 weken door PPV23, nu wel revaccinatie met PPV23 na 5 jaar aangeraden met de aanbeveling om PPV23 om de 5 jaren te herhalen bij ernstig onderliggende comorbiditeit.
- Bij gezonde volwassenen tussen 65 en 85 jaar is het voorkeursschema om opeenvolgend te vaccineren met PCV13 gevolgd door PPV23. Het aanbevolen interval tussen beide vaccins voor gezonde volwassenen tussen 65 en 85 jaar is minstens 1 jaar. Als alternatief vaccinatieschema kan ook eenmalig enkel het PPV23 toegediend worden bij deze groep.

Hoge Gezondheidsraad; Advies 9562 - Vaccinatie tegen pneumokokken volwassenen

Gezonde personen tussen 65 en 85 jaar:

- Voorkeursschema:
 - PCV13 gevolgd door PPV23 na minstens 1 jaar
 - Personen die in het verleden gevaccineerd werden met PPV23:
 - Eenmalig PCV13 minstens 1 jaar na laatste PPV23
- Alternatief schema: PPV23
 - Indien er gekozen wordt om slechts 1 pneumokokkenvaccin te gebruiken wordt het gebruik van PPV23 aangeraden om de breedste bescherming te bieden
- Revaccinatie:
 - Niet aanbevolen (cf. infra: duur van de aanbeveling)



Pneumokokken

Alternatief voor Pneumovax 23 wegens ontbreken hiervan. Is Prevenar 13 ook goed? Maar deze moet herhaald worden?

Prof. dr. Heidi Theeten (UAntwerpen)

Alternatief voor Pneumovax 23 wegens ontbreken hiervan. Is Prevenar 13 ook goed? Maar deze moet herhaald worden?

- Prevenar hoeft niet herhaald te worden, maar als nadien Pneumo23 terug ter beschikking komt is het nuttig dit nog te geven.