



Vraag 13

koppel: de vrouw besmet met HPV, zij is pt bij mij : “enige en eerste partner “.

Ik vertel haar dat de besmetting via seksueel contact komt;

waarop ze zegt "dan moet het van mijn man komen".

Deze laatste gaat naar zijn arts en hij heeft "niets“.

Is dit mogelijk ? Of is er "een haar in de boter“?

Prof. dr. Pierre Van Damme (UAntwerpen)

Prof. dr Alex Vorsters

Antwoord: We zullen het nooit weten.

- HPV wordt idd voornamelijk overgedragen via seksueel contact maar ook transmissie via andere routes (perinataal, niet seksueel/horizontaal) zijn mogelijk.
- In deze casus ontbreekt informatie over welk HPV type bij de vrouw is waargenomen en welk staal en test zijn gebruikt.
- Er is geen goedgekeurde procedure om na te gaan of een man een HPV infectie heeft. Ook hier ontbreekt info over welke test en waar staalname bij de man is gebeurd.
- Nagaan of er HPV antistoffen aanwezig zijn bij de partner om een voorbije infectie te documenteren is geen optie. Er zijn geen commerciële testen beschikbaar die antistoffen tegen HPV detecteren en bovendien ontwikkelt niet iedereen circulerende antistoffen na infectie.
- Het kan ook dat de man ondertussen de infectie heeft geklaard en zijn vrouw positief is gebleven of dat een vroegere infectie, eventueel wel overgedragen door de partner, terug is gereactiveerd.

Besluit:

- HPV transmissie ook tussen koppels is complex en zelfs indien hetzelfde genotype bij zowel vrouw als man wordt gevonden, is dat nog geen sluitend bewijs dat de partners mekaar besmet hebben.
- We moeten duidelijk stellen dat dit virus veel voorkomt, meer dan 70-80% van de mannen en vrouwen komen er ooit mee in contact... . Testen van een partner is niet zinvol en brengt geen sluitende informatie.
- Afhankelijk van leeftijd kan HPV vaccinatie wel nog aanbevolen worden.