

Zou bij de tabel simultaan vaccineren ook gele koorts kunnen opgenomen worden (Stamaril) ?

Kan het gele koorts vaccin samen met MMR vax pro? Is de immunopbouw van MBR voldoende? Sommige behandelende artsen adviseren bij simultane toediening om de MMR te herhalen (kind kreeg simultaan Stamaril en MMR-vaxPro op 51 weken)



Prof. Dr. Pierre Van Damme
(Universiteit Antwerpen)

RESEARCH

Open Access



Immune response to co-administration of measles, mumps, and rubella (MMR), and yellow fever vaccines: a randomized non-inferiority trial among one-year-old children in Argentina

Carla Vizzotti^{1†}, Jennifer B. Harris^{2*†}, Analía Aquino¹, Carolina Rancaño¹, Cristian Biscayart¹, Romina Bonaventura³, Andrea Pontoriero³, Elsa Baumeister³, Maria Cecilia Freire³, Mirta Magariños⁴, Blanca Duarte⁵, Gavin Grant², Susan Reef², Janeen Laven⁶, Kathleen A. Wannemuehler^{2,7}, Alba Maria Roperó Alvarez⁸ and J. Erin Staples⁶

3 groepen kinderen vergeleken (N=738): co-administratie of 4 weken tussen tijd

- **Zeer hoge sero-conversie in de 3 groepen, telkens voor alle antilichaamtesten**
- **Antilichaamconcentraties iets lager voor GK en Rubella in de co-administratie groep**
- **Conclusie:**
 - Wat is de klinische betekenis van die lagere antilichamenconcentratie
 - Afweging tussen het risico op gemiste vaccinatie versus mogelijke impact van lagere antilichamenconcentratie
 - 4 weken tussentijd blijft in die zin een optie naast co-administratie afhankelijk van hoeveel tijd men heeft om extra visites in te lassen