

Vaccinatiegraad bij kinderen 18-24 maanden in Wallonie, 2015 (n=562)

Tabel 2. Vaccinatiegraad volgens vaccintype in FWB

Vaccin	1e raadpleging	2e raadpleging	3e raadpleging	4e raadpleging	5e raadpleging
	8 weken	12 weken	16 weken	12 maanden	15 maanden
Hexavalent	98.8 (98.0-99.8)	98.5 (97.5-99.5)	98.2 (97.0-99.3)		92.3 (90.1-94.5)
Pneumokokken	97.6 (96.3-98.9)		96.9 (95.4-98.3)	92.9 (90.7-95.0)	
MBR				95.6 (93.9-96.4)	
Méningokokken					91.2 (88.8-93.6)
Rotarix®	69.0 (65.2-72.9)	67.0 (63.1-71.0)			
Rotateq®	21.2 (17.8-24.7)	20.3 (17.0-23.7)	20.1 (16.8-23.5)		

Bijna 87 % van de kinderen ontving de negen aanbevolen dosissen, iets minder dan 80 % kreeg het volledig schema, inclusief het vaccin tegen rotavirus.

Emmanuelle Robert, PhD; emrobert@ulb.ac.be, École de Santé Publique, Centre de recherche « Epidémiologie, biostatistiques et recherche clinique ». Université Libre de Bruxelles, Route de Lennik, 808, 1070 Bruxelles, Belgique.*

Béatrice Swennen°, MD, MPH; bswennen@ulb.ac.be, École de Santé Publique, Centre de recherche «