

Vraag en Antwoord

Griep

Prof. Dr. Corinne Vandermeulen



Vraag

Bundel pagina 39

Griepvaccinatie voor kinderen, waarom wel of niet?

Prof. Dr. Corinne Vandermeulen, LUVAC - KU Leuven

Griepvaccinatie van kinderen

Er is meer en meer vraag naar griepvaccinatie voor kinderen:

- Waarom wel of niet geven?
- Wordt het voor alle kinderen aanbevolen of enkel chronisch zieke kinderen?
- Wat met baby's?
- Moet 2x de halve dosis toegediend worden met 1 maand ertussen?
- Kan vanaf 12 jaar of vroeger gewoon 1 volledige vaccinatie?

Griepvaccinatie van kinderen

Vraag

- Tot welke leeftijd dient er een halve dosis gegeven te worden?

Rood: 36 maanden

Wit: 9 jaar

Groen: 12 jaar

Griepvaccinatie van kinderen

Antwoord

- Tot welke leeftijd dient er een halve dosis gegeven te worden?

Rood: 36 maanden

Wit: 9 jaar

Groen: 12 jaar

Griepvaccinatie van kinderen

Aanbeveling HGR voor kinderen:

- **Groep 1:** personen met verhoogd risico op complicaties
 - Kinderen >6 maanden met chronische aandoeningen
 - Hart
 - Longen, inclusief ernstig asthma
 - Leveraandoeningen
 - Nierziekten
 - Metabole aandoeningen (incl diabetes)
 - Neuromusculaire aandoeningen
 - Immuunstoornissen
- **Groep 3:** Kinderen wonende onder hetzelfde dak als
 - Risicopersonen uit groep 1
 - Kinderen jonger dan 6 maanden

Griepvaccinatie van kinderen

Veralgemeende griepvaccinatie van kinderen?

- Reden?

- Kinderen grote verspreiders van griep
 - Door vaccinatie van kinderen: impact op verspreiding binnen de populatie?
 - Deels, maar niet volledig!

- KCE-rapport

- Momenteel niet kosteneffectief
 - Kosten moeten met $1/4^e$ dalen:
 - lagere prijs griepvaccin
 - vaccinatie via Kind&Gezin en CLB's noodzakelijk om kosteneffectief te zijn

Griepvaccinatie van kinderen

Hoe toedienen?

- **Kinderen 6 tot 35 maanden:** halve dosis = 0,25 ml
 - Beperkte klinische gegevens van trivalent vaccin
 - Quadrivalente vaccins: momenteel resultaten geanalyseerd voor Europese vaccins
- **Kinderen vanaf 36 maanden:** volledige dosis = 0,5 ml
- **Kinderen <6 maanden:** geen gegevens over klinische doeltreffendheid
 - Beter vaccinatie van moeder tijdens de zwangerschap
- **Bij kinderen <9 jaar:** indien 1^e vaccinatie:
 - herhaling na minimum 4 weken