

**Vraag en antwoord:  
schema HPV-vaccins**

Prof Dr Pierre Van Damme,  
Universiteit Antwerpen

Vraag

- Een leerlinge vertrekt binnenkort naar Nieuw-Zeeland. Ze kreeg al twee Gardasil-vaccins toegediend. Zij zal niet binnen het jaar terugkeren naar België.
- Wat met de 3<sup>o</sup> vaccinatie?

Schema HPV-vaccin

- Vuistregel 1:
  - NIET wijzigen van soort HPV-vaccins. Geen gegevens bekend over veiligheid en doeltreffendheid.
- Aanbeveling:
  - Schema afwerken in Nieuw-Zeeland binnen 12M
  - Schema afwerken in België, maar dan kijken we af van de aanbeveling in de bijsluiter. In dit geval baseert men zich op de algemene aanbeveling van de vaccinologie.

Schema HPV-vaccin

- Wat is er aanbevolen voor Gardasil en het schema:
  - Minimum 1 maand tussen dosis 1 en 2
  - Interval van minimum 3 maanden tussen dosis 2 en 3
  - Alles toedienen binnen de 12 maanden
- Merck, US:
  - De derde dosis kan toegediend worden na 12 maanden, mits in achtname van de juiste intervallen voor dosis 1 en 2; er wordt geen verminderde werkzaamheid verwacht.
  - Geen nood om te herstarten!

Schema HPV-vaccin

- Wat is er aanbevolen voor Cervarix en het schema:
  - Minimum 1 maand tussen dosis 1 en 2
  - 2<sup>o</sup> dosis kan toegediend worden 1 à 2.5 maanden na dosis 1
  - En de 3<sup>o</sup> dosis 5 à 12 maanden na dosis 1
  - Interval van minimum 3 maanden tussen dosis 2 en 3
  - Alles toedienen binnen de 12 maanden

Ref.: Summary of Product Characteristics,  
European Medicine Agency