Vragen en antwoorden Meningokokken C

Valentijn Vaccinatiesymposium
18 februari 2011

Dr. Geert Top
Toezicht Volksgezondheid
Infectieziekten en Vaccinaties

MenC booster in Vlaanderen?

- ACIP veranderde recentelijk zijn aanbeveling en raadt nu een MenC booster aan. Ook in de UK overweegt men een eventuele herhalingsinenting bij adolescenten.
- In Vlaanderen: altijd gevaccineerd boven de leeftijd van 1 jaar.
- In 2001 werd gestart met vaccinatie tegen MenC omwille van epidemische redenen, niet omdat er een vaccin was.
- Het eerste advies van de HGR was trouwens om enkel te vaccineren voor individuele protectie, maar er kwam een epidemische toename met een agressievere stam, met verhoogde letaliteit en restletsels, wat leidde tot het bijsturen van het advies en het starten met de vaccinatiecampagne eind 2001.
- In 2001 bedroeg de sterfte door MenC infecties ongeveer 12-13% vergeleken bij 4% voor MenB infecties.

Epidemiologie MenB en menC



Epidemiologie MenC



MenC booster in Vlaanderen?

- Er is geen dringende reden om te veranderen van strategie: tot nu toe geen "vaccine failure" en momenteel geen gevallen van MenC infecties bij kinderen
- Er zijn nieuwe geconjugeerde vaccins op de markt tegen meningokokken van serogroepen A,C,W135 en Y (merknamen: Menactra en Menveo).
- Wanneer dit vaccin in België ter beschikking komt, kan eventueel overwogen worden hiermee te vaccineren, al dan niet als booster. De huidige epidemiologie toont echter nog geen enkel geval van vaccine failure
- er is momenteel niet echt circulatie van groep C meningokokken. Best wordt naar de toekomst toe hierover een advies van de HGR gevraagd.
- Hierbij aansluitend: vraag over zin of noodzaak van inhaalvaccinatie tegen MenC?
- Kinderen die niet gevaccineerd werden tegen MenC mogen zeker een inhaalvaccinatie krijgen. De meeste CLB's bieden dit aan ter gelegenheid van een consult of een vaccinatiemoment. Dit lijkt best wel zinvol omdat de vaccinatie toch vrij lang beschermt.