



VB  


Vraag en antwoord:
vaccinatieplaats





Prof Dr Pierre Van Damme,
Universiteit Antwerpen


 **Vraag** 



- Wanneer mag er overgeschakeld worden op de bovenarm?
- Vanaf 1 jaar ?
- Geven we de vaccinatie van 12 maanden nog in de dij?
- Waarom overschakelen?



 **Waarom overschakelen?** 


- Kan om praktische redenen
- Vuistregel 1:
 - NIET in de M. deltoideus onder leeftijd 12 m
 - Spiermassa is onvoldoende
- Vuistregel 2:
 - Zuigelingenvaccinatie tot 12 m:
 - Vastus lateralis van de M. quadriceps = antero-laterale deel van de grote dijspier



 **Waarom overschakelen?** 

- Vuistregel 3:
 - Boven leeftijd 12 m:
 - Voorkeur voor M. deltoideus
 - Kan ook nog steeds in de Vastus lateralis van de M. quadriceps
 - Dus ook bij adolescenten en volwassenen

Ref.: CDC. General Recommendations on Immunization. MMWR 2006 /55 (RR15): 1-48.







- Dus als het praktischer is om op 15m in de dij te vaccineren, kan dat gerust.
- Soms kan je nog beter fixeren voor een dij dan voor een arm bij een kind >12m. Eén arm onder mama's oksel door, de benen tussen mama's gekruiste benen, en de andere arm ter hoogte van de elleboog fixeren tegen het lichaam aan

