




Vraag en antwoord Simultaan toedienen



Dr Geert Top, Vlaams Agentschap zorg en gezondheid
Dr Heidi Theeten, Vaxinfectio, UA

NeisVac-C op 12 maand (vraag)


- Wat is er tegen om op 12 maand Neisvac-C te geven? Bvb. bij stockbreuk van MBR of als een kind slechts op 9 maand de 2de Prevenar (en 3de Infanrix Hexa) gekregen heeft, waardoor de 6 maand wachttijd voor de derde Prevenar nog niet voorbij zijn.
- In het eerste voorbeeld worden dan Prevenar en Neisvac vaak gecombineerd, in het tweede MMRVAXPRO en Neisvac-C



Valentijn Vaccinatie-symposium 2011 - vragen

NeisVac-C op 12 maand (antwoord)



- Eerst en vooral: proberen tijdig te vaccineren. Dit geldt voor alle vaccins die deel uitmaken van het aanbevolen basisvaccinatieschema voor Vlaanderen.
- Al te vaak worden vaccinaties uitgesteld, ook omwille van "medische redenen", maar zonder dat er in feite een contra-indicatie is. Een snotneus en minder dan 38°C is meestal geen reden om een vaccinatie uit te stellen. Elk uitstel is immers een risico voor onvolledige vaccinatie.
- Combinatie NeisVac-C en Prevenar is geen probleem. Dit werd nagevraagd bij beide firma's en die hebben een aantal wetenschappelijke publicatie bezorgd om dit te staven. Bij overmacht kan het schema dus aangepast worden, zeker om extra vaccinatiezittingen te vermijden.



Valentijn Vaccinatie-symposium 2011 - vragen

Vraag

- Mogen we Infanrix-hexa nog altijd niet samen met MMR-VAXPRO toedienen bij een kind met een afwijkend schema?

MMRvaxpro met infanrix hexa?

- Actuele SmPC Infanrix hexa (EMA):
« te weinig gegevens om een uitspraak te doen over concomitante toediening met MBR »
- Trial producent 2004: infanrix hexa met priorix (N=59) tov infanrix hexa alleen (N=57), geen aanwijzingen voor effect op immunogeniciteit of nevenwerkingen
- Zie Valentijn 2010: Sommige studies vinden (beperkt) verschil in antistofniveaus of nevenwerkingen bij simultaan toedienen van DTP-IPV-(Hib)-(HBV) met MMR(-V)
Schneyer 2009, Zepp 2007, Shinefield 2006, West 2001

DUS: vermijden!
tenzij sterk vermoeden dat het kind anders één van beide vaccins zal missen

