

NeisVac-C (Baxter Healthcare Ltd)

Wetenschappelijke bijsluiter

4.5. Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interacties

“Er bestaan geen gegevens over het gelijktijdige gebruik van NeisVac-C™ met hepatitis-B-vaccins of pneumokokkenconjugaatvaccins. Het gelijktijdige gebruik van NeisVac-C™ met hepatitis-B-vaccins of pneumokokkenconjugaatvaccins mag uitsluitend worden overwogen indien het medisch belangrijk is en het niet gaat om een standaard toediening.”

conjugaat MenC vaccins: wat mag simultaan?

Huidige bijsluiters vermelden onvoldoende of geen gegevens over veiligheid en immunrespons na gelijktijdige toediening van

- *Neisvac-C (Baxter) (bijsluiter 1/02)*

met: IM polio, Pneumokok, Hep B (?)

Kinkhoest: mag simultaan, hoewel enkel gegevens qua veiligheid

Hep B: (beperkte) gegevens bij baby's en adolescenten geruststellend

- *Meningitec (Wyeth) (bijsluiter 5/04)*

met: Pneumokok (beperkte gegevens immunrespons OK)

Mag Engerix jr + NeisVacC gelijktijdig?

- Bij baby's is simultane toediening bestudeerd van NeisVac-C met Hexavac (N=330) en van NeisVac-C met Infanrix-Hexa (N=350)
- Bij adolescenten is simultane toediening van NeisVac-C met HBvaxpro onderzocht (N=439)
- Immuunrespons en nevenwerkingenprofiel vergelijkbaar
- Simultane toediening kan met HBvaxpro
- Niet bestudeerd voor andere merken-vermoedelijk ook OK

ESPID 2004 abstract book

Tejedor JC et al, Pediatr Infect Dis J 2004

ESPID 2006 abstract book