

Vraag & Antwoord

Vaccinatietechniek



Prof. dr. Corinne Vandermeulen, PhD



Vraag

Welke plaats raden jullie aan voor vaccintoediening bij kinderen tussen 1 en 3 jaar?

Prof. dr. Corinne Vandermeulen, PhD, Leuvens Universitair Vaccinologie Centrum (LUVAC)

Wat is de voorkeursplaats voor het toedienen van het hexavalent vaccin en het MenC-vaccin op de leeftijd van 15 maanden?



- Elk vaccin in één van de beide bovenbenen (buitenkant van M. vastus lateralis)
- Beide vaccins in hetzelfde bovenbeen (buitenkant van M. vastus lateralis)
- Elk vaccin in één van beide deltoïdspieren van de bovenarm
- Beide vaccins in dezelfde deltoïdspier van de bovenarm
- Eén vaccin in de bovenarm en één vaccin in het bovenbeen

Wat is de voorkeursplaats voor het toedienen van het hexavalent vaccin en het MenC-vaccin op de leeftijd van 15 maanden?

- Elk vaccin in één van de beide bovenbenen (buitenkant van M. vastus lateralis)
- Beide vaccins in hetzelfde bovenbeen (buitenkant van M. vastus lateralis)
- Elk vaccin in één van beide deltoïdspieren van de bovenarm
- Beide vaccins in dezelfde deltoïdspier van de bovenarm
- Eén vaccin in de bovenarm en één vaccin in het bovenbeen

Aanbeveling

Vanaf de leeftijd van 12 maanden worden in België de vaccins in de bovenarm (M. Deltoideus) toegediend.



Reden: kinderen beginnen te stappen vanaf de leeftijd van 12m.